

**Prélèvements obligatoires inscrits dans l'annexe sanitaire du Stud Book Français - 2020**  
*Préconisations de la Fédération des Eleveurs de Galop*  
**Analyses à faire effectuer dans un laboratoire agréé**

	<b>POUR LA JUMENT</b> Tests à faire à partir du 1er janvier 2020 et avant toute saillie, sauf pour les juments pleines et suitées		<b>POUR L'ÉTALON</b> Tests à faire à partir du 1er décembre 2019 et avant la demande de carnet de saillie
	Site	<b>Clitoris (sinus et/ou fosse)</b>	<b>Col utérin</b>
METRITE CONTAGIEUSE EQUINE (TAYLORELLA EQUIGENITALIS) Klebsiella pneumonia Pseudomonas aeruginosa	VIDE OU MAIDEN	Métrite à Taylorella - Immunofluorescence (IF), PCR ou culture bactérienne avec résultat négatif : ok - Si IF positive => résultat négatif en culture bactérienne ou PCR : OK <b>- Si culture bactérienne ou PCR positive ==&gt; KO (ne pas faire saillir, traitement obligatoire)</b>	- Immunofluorescence (IF), PCR ou culture bactérienne avec résultat négatif : ok <b>- Si IF positive =&gt; résultat négatif en culture bactérienne ou PCR : OK</b>
		- Klebsiella/Pseudomonas positif > OK L'intérêt d'un traitement local doit être évalué avec votre vétérinaire. Aucune corrélation n'a été mise en évidence entre la présence de ces bactéries sur le clitoris de la jument et la contamination intrautérine des juments ou le pénis de l'étalon. De plus, un tel traitement peut détruire la flore saprophyte et favoriser une contamination plus intense par des bactéries pathogènes. En tout état de cause, un typage capsulaire pour Klebsiella est vivement conseillé (seuls certains types sont transmissibles par voie sexuelle)	- Klebsiella/Pseudomonas positif => <b>OK (même remarque que ci-contre concernant le traitement)</b>
	PLEINE ET SUITEE	<b>Idem jument vide ou maiden</b>  Moins de 30 jours avant poulinage	<b>A faire sur chaleur (dont chaleur de poulinage)</b> <b>Idem jument vide ou maiden</b> <b>Recherche de la flore associée par culture bactérienne ==&gt; interprétation par vétérinaire</b>
ARTÉRITE VIRALE ÉQUINE	- 1 résultat séroneutralisation ou Elisa négatif : OK - 2 résultats séroneutralisation positifs stables ou déclinants espacés de <b>plus de 14 jours</b> : OK - 1 résultat séroneutralisation positif stable ou déclinant par rapport à 1 résultat séroneutralisation année N-1 ou N-2, un laboratoire différent est autorisé : OK - Si Elisa positif => <b>1 résultat séroneutralisation négatif</b> ou 2 résultats séroneutralisation positifs stables ou déclinants à <b>plus de 14 jours</b> d'intervalle : OK - Si 2 résultats séroneutralisation positifs croissants : => KO (Ne pas faire saillir) <b>Test datant de moins de 60 jours</b> <b>Il est conseillé de réserver l'utilisation du test Elisa uniquement pour le suivi de la jument au cours de la saison de monte</b>		- 1 résultat séroneutralisation ou Elisa avec résultat négatif : OK - Ou si résultat séroneutralisation ou Elisa avec résultat positif => virologie sur sperme avec résultat négatif : OK - Ou étalon valablement vacciné (selon protocole AMM infra) : OK  <b>Suivi sérologique (test de séroneutralisation) régulier des étalons vaccinés après chaque rappel vaccinal (intérêt en cas de rupture de disponibilité du vaccin ARTERVAC)</b> <b>Il est conseillé de réserver l'utilisation du test Elisa uniquement pour le suivi de l'étalon au cours de la saison de monte</b>
ANÉMIE INFECTIEUSE DES ÉQUIDÉS			Test de Coggins <b>(ou ELISA pour les étalons en provenance d'autres Etats Membres test réalisé dans autre Etat Membre)</b> 1 résultat négatif datant de moins de 3 mois pour 1 <sup>ère</sup> monte, puis test renouvelé tous les 3 ans

DOURINE		1 résultat sérologique négatif (Test de fixation du complément) de moins de 3 mois si séjour dans les 12 derniers mois dans pays non indemne de Dourine
<b>Vaccinations obligatoires inscrites dans l'annexe sanitaire du règlement du Stud Book Français</b>		
GRIPPE	<b>Avant la saillie</b>	<b>Avant la demande de carnet de monte</b>
	Vaccination préalable à la DPS (au minimum, deux injections de primo-vaccination) Selon AMM du vaccin, une primo vaccination : 2 injections séparées de 3 à 6 semaines 1er rappel à 6 mois, puis un rappel au moins annuel : ok	Vaccination préalable à la demande de carnet (au minimum, deux injections de primo-vaccination) Selon AMM du vaccin, une primo vaccination : 2 injections séparées de 3 à 6 semaines 1er rappel à 6 mois, puis un rappel au moins annuel : ok
RHINOPNEUMONIE	<b>Avant la saillie</b>	<b>Avant la demande de carnet de monte</b>
	Vaccination préalable à la DPS (au minimum, deux injections de primo-vaccination) Selon AMM du vaccin, une primo vaccination : 2 injections séparées de 3 à 6 semaines, 1er rappel à 6 mois, puis rappel au moins annuel (mieux tous les six mois) : ok	Vaccination préalable à la demande de carnet (au minimum, deux injections de primo-vaccination) Selon AMM du vaccin, une primo vaccination : 2 injections séparées de 3 à 6 semaines, 1er rappel à 6 mois, puis rappel au moins annuel (mieux tous les six mois) : ok
<b>Toute rupture dans un protocole de vaccinations nécessite une nouvelle primo-vaccination</b>		
<b>Vaccination fortement recommandée inscrite dans l'annexe sanitaire du règlement du Stud Book Français</b>		
ARTÉRITE VIRALE EQUINE		<b>Vaccination Etalon et Boute-en-train</b>
		EQUIP ARTERVAC® - sérologie négative dans les 30 jours précédant la première injection de primo-vaccination Primo-vaccination par 2 injections séparées de 3 à 6 semaines Isolement de l'étalon entre la date du prélèvement pour le test sérologique et la seconde injection de primovaccination. Rappel tous les 6 mois avec une tolérance à 8 mois maximum. (Attention, la notice du vaccin recommande un rappel de vaccination tous les 6 mois. Il est donc vivement conseillé de respecter ce délai, notamment si l'étalon est amené à faire la monte à l'étranger).  <b>'En cas de rupture vaccinale (dernière injection de vaccination supérieure à 8 mois), la primo-vaccination peut être reprise dans les 30 jours suivant un contrôle virologique sur sperme négatif.</b>
<b>TECHNIQUES D'ANALYSE</b>		
TAYLORELLA	CULTURE OU PCR OK pour 6 pays signataires Common Code of Practice Pour Newmarket analyses à réaliser par laboratoire agréé HBLB (en France, LABÉO Frank Duncombe) IMMUNOFLUORESCENCE (IF) OK UNIQUEMENT en France	CULTURE OU PCR OU IF : OK
KLEBSIELLA PSEUDOMONAS	CULTURE OU PCR OK pour 6 pays signataires Common Code of Practice	CULTURE OU PCR : OK
ARTERITE VIRALE EQUINE	SERONEUTRALISATION OU ELISA si séropositive faire 2 séroneutralisations	SERONEUTRALISATION OU ELISA si vacciné faire séroneutralisation
ANEMIE INFECTIEUSE		COGGINS OU ELISA (non agréé en France) accepté pour les étalons en provenance d'autre Etat Membre test réalisé dans autre Etat Membre moins de 3 mois avant 1ère monte renouvelé tous les 3 ans