



Commission Sanitaire
Responsable : Antonia DEVIN

Protocole de Monte 2021



Protocole de Monte 2021

- Le protocole de monte 2021 ne prévoit pas d'évolution majeure par rapport au protocole 2020.
- Ce protocole est conforme aux recommandations de l'International Codes of Practice 2021 (mise à jour en Juillet 2020), disponible sur le site de l'HBLB [<https://codes.hblb.org.uk>].
- Le résultat des tests sanitaires et la copie du feuillet de vaccination du livret de la jument doivent impérativement être envoyés à l'éta lonnier, au plus tard la veille de la saillie et en tout état de cause, avant le déplacement de la jument.



Protocole de Monte 2021

Vaccination Grippe et Rhinopneumonie

Compte tenu de l'actualité, il convient de rappeler le protocole vaccinal unique pour ces deux maladies :

- **Primo-injection (Dès l'âge de 6 mois et avant la fin de l'année de naissance) :**
2 injections effectuées dans un intervalle de temps minimum de 21 jours et maximum de 92 jours
- **1er Rappel :**
Une injection de rappel contre ces maladies effectuée dans un délai minimum de 150 jours et maximum de 215 jours, après la deuxième injection de la primo vaccination.
- **Rappels ultérieurs :**
Des injections ultérieures de rappel effectuées de préférence dans un délai n'excédant pas six mois **et en tout état de cause dans un délai ne pouvant excéder douze mois.**



Protocole de Monte 2021

Préconisations de la Fédération des Eleveurs du Galop

Analyses à faire effectuer dans un laboratoire agréé



Protocole de Monte 2021

I) METRITE CONTAGIEUSE EQUINE (TAYLORELLA EQUIGENITALIS) – Klebsiella pneumonia – Pseudomonas aeruginosa

POUR LA JUMENT :

Tests à faire à partir du 1er janvier 2021 et avant toute saillie, sauf pour les juments pleines et suitées

POUR L'ETALON :

Tests à faire à partir du 1^{er} décembre 2020 et avant la demande de carnet de saillie

I) MÉTRITE CONTAGIEUSE EQUINE (TAYLORELLA EQUIGENITALIS) – Klebsiella pneumonia – Pseudomonas aeruginosa

POUR LA JUMENT	Clitoris (sinus et/ou fosse)	Col Utérin
VIDE OU MAIDEN	<p>Métrite contagieuse à Taylorella</p> <ul style="list-style-type: none"> - Immunofluorescence (IF), PCR ou culture bactérienne avec résultat négatif : OK - Si IF positive => résultat négatif en culture bactérienne ou PCR : OK - Si culture bactérienne ou PCR positive ==> KO (ne pas faire saillir, traitement obligatoire). 	<ul style="list-style-type: none"> - Immunofluorescence (IF), PCR ou culture bactérienne avec résultat négatif : OK - Si IF positive => résultat négatif en culture bactérienne ou PCR : OK - Si culture bactérienne ou PCR positive ==> KO"
<p>N.B : Du fait de la rapidité d'obtention du résultat, de son excellente sensibilité (peu de faux négatif) et du très faible risque de résultat ininterprétable, la PCR est une technique très intéressante. Un résultat positif en PCR devra être confirmé par une culture bactérienne (technique de référence)</p>		
	<p>-culture bactérienne ou PCR Klebsiella/Pseudomonas positif > OK mais vigilance L'intérêt d'un traitement local et ciblé doit être évalué avec votre vétérinaire. Aucune corrélation systématique n'a été mise en évidence entre la présence de ces bactéries sur le clitoris de la jument et la contamination intra-utérine des juments ou le pénis de l'étalon. De plus, un tel traitement peut détruire la flore saprophyte et favoriser une contamination plus intense par des bactéries pathogènes. En tout état de cause, un typage capsulaire pour Klebsiella est vivement conseillé (seuls certains types sont transmissibles par voie sexuelle) Remarque : certaines protocoles intra ou hors UE ne permettent pas de saillir si Klebsiella ou Pseudomonas Positif (International Codes of practice 2021)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Immunofluorescence (IF), PCR ou culture bactérienne avec résultat négatif : OK - Si IF positive => résultat négatif en culture bactérienne ou PCR : OK - Si culture bactérienne ou PCR positive ==> KO
		<ul style="list-style-type: none"> - Recherche de la flore associée par culture bactérienne ==> interprétation par vétérinaire

I) METRITE CONTAGIEUSE EQUINE (TAYLORELLA EQUIGENITALIS) – Klebsiella pneumonia – Pseudomonas aeruginosa

POUR LA JUMENT	Clitoris (sinus et/ou fosse)	Col Utérin
PLEINE ET SUITEE	Idem jument vide ou maiden	
	Moins de 30 jours avant poulinage	<p>A faire sur chaleur (dont chaleur de poulinage)</p> <p>Idem jument vide ou maiden</p> <p>Recherche de la flore associée par culture bactérienne ==> interprétation par vétérinaire</p>

I) METRITE CONTAGIEUSE EQUINE (TAYLORELLA EQUIGENITALIS) – Klebsiella pneumonia – Pseudomonas aeruginosa

POUR L'ÉTALON	Fosse Urétrale
	<ul style="list-style-type: none"> - Immunofluorescence (IF), PCR ou culture bactérienne avec résultat négatif : ok - Si IF positive => résultat négatif en culture bactérienne ou PCR : OK - Si culture bactérienne ou PCR positive ==> KO (ne pas faire saillir, traitement obligatoire).
<p>N.B : Du fait de la rapidité d'obtention du résultat, de son excellente sensibilité (peu de faux négatif) et du très faible risque de résultat ininterprétable, la PCR est une technique très intéressante. Un résultat positif en PCR devra être confirmé par une culture bactérienne (technique de référence)</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - culture bactérienne ou PCR Klebsiella/Pseudomonas positif => OK (même remarque que pour les juments concernant le traitement et les points de vigilance)

II) ARTERITE VIRALE EQUINE

POUR LA JUMENT	POUR L'ÉTALON
<ul style="list-style-type: none"> - 1 résultat séroneutralisation ou Elisa négatif : OK - 2 résultats séroneutralisation positifs stables ou déclinants espacés de plus de 14 jours : OK - 1 résultat séroneutralisation positif stable ou déclinant par rapport à 1 résultat séroneutralisation année N-1 ou N-2, un laboratoire différent est autorisé : OK - Si Elisa positif => 1 résultat séroneutralisation négatif ou 2 résultats séroneutralisation positifs stables ou déclinants à plus de 14 jours d'intervalle : OK - Si 2 résultats séroneutralisation positifs croissants : => KO (Ne pas faire saillir) ==> réaliser une nouvelle séroneutralisation à plus de 14 jours d'intervalle jusqu'à obtention d'un statut stable (de préférence au sein du même laboratoire agréé) 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 résultat séroneutralisation ou Elisa avec résultat négatif : OK - Ou si résultat séroneutralisation ou Elisa avec résultat positif => isolement viral ou PCR sur sperme avec résultat négatif : OK - Ou étalon valablement vacciné (selon protocole AMM infra) : OK
<p>Test datant de moins de 60 jours Il est conseillé de réserver l'utilisation du test Elisa uniquement pour le suivi de la jument au cours de la saison de monte</p>	<p>Suivi sérologique (test de séroneutralisation) régulier des étalons vaccinés après chaque rappel vaccinal (intérêt en cas de rupture de disponibilité du vaccin ARTERVAC)</p> <p>Il est conseillé de réserver l'utilisation du test Elisa uniquement pour le suivi de l'étalon au cours de la saison de monte</p>

II) ANEMIE INFECTIEUSE DES EQUIDES

POUR L'ÉTALON

- Test de Coggins (test de référence pour le transport de chevaux par ailleurs ou en cas de suspicion clinique ou de cas contact - International Codes of practice)
- (ou ELISA pour les étalons en provenance d'autres Etats Membres ou du Royaume-Uni test réalisé dans autre Etat Membre ou du Royaume-Uni)
- 1 résultat négatif datant de moins de 3 mois pour 1ère monte, puis test renouvelé tous les 3 ans

III) DOURINE

POUR L'ÉTALON

- 1 résultat sérologique négatif (Test de fixation du complément) de moins de 3 mois si séjour dans les 12 derniers mois dans pays non indemne de Dourine



Protocole de Monte 2021

**Vaccinations obligatoires inscrites dans l'annexe
sanitaire du règlement du Stud-Book Français :**

GRIPPE + RHINOPNEUMONIE

GRIPPE

JUMENT	ETALON
<p>- Avant toute saillie :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vaccination conforme avant la DPS (au minimum, deux injections de primo-vaccination) - Selon notice du vaccin : ok 	<p>- Avant la demande de carnet de monte :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vaccination conforme à la demande de carnet (au minimum, deux injections de primo-vaccination) - Selon notice du vaccin : ok

RHINOPNEUMONIE

JUMENT	ETALON
<p>- Avant toute saillie :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vaccination conforme avant la DPS (au minimum, deux injections de primo-vaccination) - Selon notice du vaccin : ok - Rappels tous les 6 mois conseillé 	<p>- Avant la demande de carnet de monte :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vaccination conforme à la demande de carnet (au minimum, deux injections de primo-vaccination) - Selon notice du vaccin : ok - Rappels tous les 6 mois conseillé



Protocole de Monte 2021

**TOUTE RUPTURE DANS UN PROTOCOLE DE
VACCINATION NECESSITE UNE NOUVELLE PRIMO-
VACCINATION**



Protocole de Monte 2021

**Vaccination fortement recommandée inscrite dans
l'annexe sanitaire du règlement du Stud-Book
Français :**

**ARTERITE VIRALE EQUINE
(ETALON ET BOUTE-EN-TRAIN)**

ARTERITE VIRALE EQUINE

ETALON ET BOUTE-EN-TRAIN

EQUIP ARTERVAC®

- sérologie négative dans les 30 jours précédant la première injection de primo-vaccination

Primo-vaccination par 2 injections séparées de 3 à 6 semaines

Isolement de l'étalon entre la date du prélèvement pour le test sérologique et la seconde injection de primovaccination.

Rappel tous les 6 mois avec une tolérance à 8 mois maximum. (Attention, la notice du vaccin recommande un rappel de vaccination tous les 6 mois. Il est donc vivement conseillé de respecter ce délai, notamment si l'étalon est amené à faire la monte à l'étranger).

En cas de rupture vaccinale (dernière injection de vaccination supérieure à 8 mois), la primo-vaccination peut être reprise dans les 30 jours suivant un contrôle virologique sur sperme négatif.

TECHNIQUES D'ANALYSE

	POUR LA JUMENT	POUR L'ÉTALON
TAYLORELLA	<ul style="list-style-type: none"> - CULTURE OU PCR OK pour 6 pays signataires Common Code of Practice - Pour Newmarket analyses à réaliser par laboratoire agréé HBLB (en France, LABÉO Frank Duncombe) - IMMUNOFLUORESCENCE (IF) OK UNIQUEMENT en France 	<ul style="list-style-type: none"> - CULTURE OU PCR OU IF : OK
KLEBSIELLA PSEUDOMONAS	<ul style="list-style-type: none"> - CULTURE OU PCR OK pour 6 pays signataires Common Code of Practice 	<ul style="list-style-type: none"> - CULTURE OU PCR : OK
ARTERITE VIRALE EQUINE	<ul style="list-style-type: none"> - SERONEUTRALISATION OU ELISA - si séropositive en seroneutralisation faire 2 séroneutralisations pour montrer une stabilité des anticorps 	<ul style="list-style-type: none"> - SERONEUTRALISATION OU ELISA OU ISOLEMENT VIRAL OU PCR - si vacciné réaliser un suivi des anticorps par séroneutralisation
ANEMIE INFECTIEUSE		<ul style="list-style-type: none"> - COGGINS OU - ELISA (non agréé en France) - accepté pour les étalons en provenance d'autre Etat Membre (ou Royaume-Uni) test réalisé dans autre Etat Membre (ou Royaume-Uni) - moins de 3 mois avant 1ère monte renouvelé tous les 3 ans



Protocole de Monte 2021

ANNEXE : Tableau récapitulatif

Prélèvements obligatoires inscrits dans l'annexe sanitaire du Stud Book Français - 2021

Préconisations de la Fédération des Eleveurs de Galop

Analyses à faire effectuer dans un laboratoire agréé

	POUR LA JUMENT Tests à faire à partir du 1er janvier 2021 et avant toute saillie, sauf pour les juments pleines et suitées		POUR L'ÉTALON Tests à faire à partir du 1er décembre 2020 et avant la demande de carnet de saillie	
	Site	Clitoris (sinus et/ou fosse)	Col utérin	fosse urétrale
METRITE CONTAGIEUSE EQUINE (TAYLORELLA EQUIGENITALIS) Klebsiella pneumonia Pseudomonas aeruginosa	VIDE OU MAIDEN	Métrite contagieuse à Taylorella - Immunofluorescence (IF), PCR ou culture bactérienne avec résultat négatif : ok - Si IF positive => résultat négatif en culture bactérienne ou PCR : OK - Si culture bactérienne ou PCR positive ==> KO (ne pas faire saillir, traitement obligatoire).	- Immunofluorescence (IF), PCR ou culture bactérienne avec résultat négatif : ok - Si IF positive => résultat négatif en culture bactérienne ou PCR : OK - Si culture bactérienne ou PCR positive ==> KO	- Immunofluorescence (IF), PCR ou culture bactérienne avec résultat négatif : ok - Si IF positive => résultat négatif en culture bactérienne ou PCR : OK - Si culture bactérienne ou PCR positive ==> KO (ne pas faire saillir, traitement obligatoire).
		N.B : Du fait de la rapidité d'obtention du résultat, de son excellente sensibilité (peu de faux négatif) et du très faible risque de résultat ininterprétable, la PCR est une technique très intéressante. Un résultat positif en PCR devra être confirmé par une culture bactérienne (technique de référence)		
	- culture bactérienne ou PCR Klebsiella/Pseudomonas positif > OK mais vigilance L'intérêt d'un traitement local et ciblé doit être évalué avec votre vétérinaire. Aucune corrélation systématique n'a été mise en évidence entre la présence de ces bactéries sur le clitoris de la jument et la contamination intra-utérine des juments ou le pénis de l'étalon. De plus, un tel traitement peut détruire la flore saprophyte et favoriser une contamination plus intense par des bactéries pathogènes. En tout état de cause, un typage capsulaire pour Klebsiella est vivement conseillé (seuls certains types sont transmissibles par voie sexuelle) remarque; certains protocoles intra ou hors UE ne permettent pas de saillir si Klebsiella ou Pseudomonas Positif (International Codes of practice 2021)	- Klebsiella/Pseudomonas positif => OK (même remarque que ci-contre concernant le traitement et les points de vigilance) Recherche de la flore associée par culture bactérienne ==> interprétation par vétérinaire	- culture bactérienne ou PCR Klebsiella/Pseudomonas positif => OK (même remarque que pour les juments concernant le traitement et les points de vigilance)	
PLEINE ET SUITEE	Idem jument vide ou maiden Moins de 30 jours avant poulinage		A faire sur chaleur (dont chaleur de poulinage) Idem jument vide ou maiden Recherche de la flore associée par culture bactérienne ==> interprétation par vétérinaire	
ARTÉRITE VIRALE ÉQUINE	- 1 résultat séroneutralisation ou Elisa négatif : OK - 2 résultats séroneutralisation positifs stables ou déclinants espacés de plus de 14 jours : OK - 1 résultat séroneutralisation positif stable ou déclinant par rapport à 1 résultat séroneutralisation année N-1 ou N-2, un laboratoire différent est autorisé : OK - Si Elisa positif => 1 résultat séroneutralisation négatif ou 2 résultats séroneutralisation positifs stables ou déclinants à plus de 14 jours d'intervalle : OK - Si 2 résultats séroneutralisation positifs croissants : => KO (Ne pas faire saillir) ==> réaliser une nouvelle séroneutralisation à plus de 14 jours d'intervalle jusqu'à obtention d'un statut stable (de préférence au sein du même laboratoire agréé) Test datant de moins de 60 jours Il est conseillé de réserver l'utilisation du test Elisa uniquement pour le suivi de la jument au cours de la saison de monte		- 1 résultat séroneutralisation ou Elisa avec résultat négatif : OK - Ou si résultat séroneutralisation ou Elisa avec résultat positif => isolement viral ou PCR sur sperme avec résultat négatif : OK - Ou étalon valablement vacciné (selon protocole AMM infra) : OK Suivi sérologique (test de séroneutralisation) régulier des étalons vaccinés après chaque rappel vaccinal (intérêt en cas de rupture de disponibilité du vaccin ARTERVAC) Il est conseillé de réserver l'utilisation du test Elisa uniquement pour le suivi de l'étalon au cours de la saison de monte	
ANÉMIE INFECTIEUSE DES ÉQUIDÉS			Test de Coggins (test de référence pour le transport de chevaux par ailleurs ou en cas de suspicion clinique ou de cas contact - International Codes of practice) (ou ELISA pour les étalons en provenance d'autres Etats Membres ou du RU test réalisé dans autre Etat Membre ou au RU) 1 résultat négatif datant de moins de 3 mois pour 1 ^{ère} monte, puis test renouvelé tous les 3 ans	

DOURINE		1 résultat sérologique négatif (Test de fixation du complément) de moins de 3 mois si séjour dans les 12 derniers mois dans pays non indemne de Dourine
Vaccinations obligatoires inscrites dans l'annexe sanitaire du règlement du Stud Book Français		
GRIPPE	Avant toute saillie	Avant la demande de carnet de monte
	Vaccination conforme avant la DPS (au minimum, deux injections de primo-vaccination) Selon notice du vaccin : ok	Vaccination conforme à la demande de carnet (au minimum, deux injections de primo- vaccination) Selon notice du vaccin : ok
RHINOPNEUMONIE	Avant toute saillie	Avant la demande de carnet de monte
	Vaccination conforme avant la DPS (au minimum, deux injections de primo-vaccination) Selon notice du vaccin : ok Rappels tous les 6 mois conseillé	Vaccination conforme à la demande de carnet (au minimum, deux injections de primo- vaccination) Selon notice du vaccin : ok Rappels tous les 6 mois conseillé
Toute rupture dans un protocole de vaccination nécessite une nouvelle primo-vaccination		
Vaccination fortement recommandée inscrite dans l'annexe sanitaire du règlement du Stud Book Français		
		Vaccination Etalon et Boute-en-train
ARTÉRITE VIRALE EQUINE		EQUIP ARTERVAC® - sérologie négative dans les 30 jours précédant la première injection de primo- vaccination Primo-vaccination par 2 injections séparées de 3 à 6 semaines Isolement de l'étalon entre la date du prélèvement pour le test sérologique et la seconde injection de primovaccination. Rappel tous les 6 mois avec une tolérance à 8 mois maximum. (Attention, la notice du vaccin recommande un rappel de vaccination tous les 6 mois. Il est donc vivement conseillé de respecter ce délai, notamment si l'étalon est amené à faire la monte à l'étranger).
		'En cas de rupture vaccinale (dernière injection de vaccination supérieure à 8 mois), la primo-vaccination peut être reprise dans les 30 jours suivant un contrôle virologique sur sperme négatif.
TECHNIQUES D'ANALYSE		
TAYLORELLA	CULTURE OU PCR OK pour 6 pays signataires Common Code of Practice Pour Newmarket analyses à réaliser par laboratoire agréé HBLB (en France, LABÉO Frank Duncombe) IMMUNOFLUORESCENCE (IF) OK UNIQUEMENT en France	CULTURE OU PCR OU IF : OK
KLEBSIELLA PSEUDOMONAS	CULTURE OU PCR OK pour 6 pays signataires Common Code of Practice	CULTURE OU PCR : OK
ARTERITE VIRALE EQUINE	SERONEUTRALISATION OU ELISA si séropositive en séroneutralisation faire 2 séroneutralisations pour montrer une stabilité des anticorps	SERONEUTRALISATION OU ELISA OU ISOLEMENT VIRAL OU PCR si vacciné réaliser un suivi des anticorps par séroneutralisation
ANEMIE INFECTIEUSE		COGGINS OU ELISA (non agréé en France) accepté pour les étalons en provenance d'autre Etat Membre (ou RU) test réalisé dans autre Etat Membre (ou RU) moins de 3 mois avant 1ère monte renouvelé tous les 3 ans